

AMEGA

Folyékony gyomirtó permetezőszer.

Hatóanyag:
480 g/l glifozát
izopropilaminsó.

Forgalmazási
kategória: III.

Csomagolás:
5 l-es, 10 l-es,
25 l-es műanyag
kanna.

Felhasználható:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége (l/ha) víz	
Őszi búza	Évelő egy- és kétszikű gyomnövények	3,0–5,0	150–250
Szántóföld	Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények Évelő egy- és kétszikű gyomnövények	1,5–2,5 3,0–5,0	150–250
Napraforgó, kukorica	Állományszárítás	1,5 és 4,0	50–60
Szója	Állományszárítás	2,5 és 4,0	150–250
Szőlő, gyümölcsös (3 évesnél idősebb)	Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények Évelő egy- és kétszikű gyomnövények	1,5–2,5 3,0–5,0	150–200
Legelő, gyepek	Totális gyomirtás	3,0–5,0	250–300
Erdészet (két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglaszfenyő)	Totális gyom- és cserjeirtás	2,5–4,0	250–300
Fakitermelés	Sarjhajtások ellen	3,0%	
Mezőgazdaságilag nem művelt területek, csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek	Totális gyom- és cserjeirtás	4,0–5,5	250–300
Lucerna	Arankirtás	0,15–0,2% 0,4–0,5	150–250



Javasolt növényvédelmi technológia:

Állományszárításra a kukoricaszemek 30–40, illetve a kaszatok 20–30%-os víztartalmánál kell kijuttatni.

Szójában a szemek 30% körüli nedvességtartalmánál kell permetezni.

Lucernában arankával fertőzött területen foltkezelés, vagy teljes felületkezelés formájában alkalmazható. Foltkezelés esetén 0,15–0,2%-os koncentrációban kell felhasználni. Teljes felületkezelés esetén 0,4–0,5 l/ha a készítmény dózisa. Kaszálás után 5–7 nappal kell elvégezni a kezelést.

Szőlőben és gyümölcsösben a szüret után, vagy tavasszal a hajtásnövekedés kezdetéig kell kipermetezni. A kultúrnövény zöld részeire ne kerüljön permetlé, mert azok teljes pusztulását okozhatja.

Legelőkön, gyepterületeken a feltörést, vagy az újravetést megelőzően kell alkalmazni.

Fenyőtelepítésekben akkor használható, ha a védettséget biztosító viaszréteg a tűleveleken ép.

Mezőgazdaságilag nem művelt területeken totális gyomirtásra használható.

Vízzel nem borított csatornák, halastavak, mocsaras területek gyomirtására nád, gyékény és egyéb évelő gyomok irtására a vegetációs időben használható.

Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban és kukoricában legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalék felhasználásával.

Vízmenyiség: 50–60 l/ha.

Permetléporlasztás: finom porlasztás javasolt.

