

CHAMPION 2 FL

**Folyékony
gomba-
és baktériumölő
permetezőszer.**

**Hatóanyag:
36% rézhidroxid.**

**Forgalmazási
kategória: I.**

**Csomagolás:
10 l-es műanyag
kanna.**



Felhasználható:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges	
		szer mennyisége (l/ha)	víz
Szőlő	Peronoszpóra, orbánc	1,75–2,0	800–1000
Almatermésűek	Baktériumos ágelhalás, gombabetegségek (kivéve lisztharmat)	1,75–2,0	800–1500
Almatermésűek	Tüzelhalás	2,25–3,0	800–1500
Csonthéjasok (őszibarackban rügyfakadásig, kajsziabarackban pirosbimbós állapotig és lombhullás kezdetén)	Baktériumos és gombás eredetű ágelhalás, levéllyukacsosodás, monília, tafrina, gnomóniás betegség és egyéb gombás betegségek (kivéve lisztharmat)	1,75–2,0	1000–1500
Málna	Vesszőbetegségek	1,75–2,0	500–800
Héjas gyümölcsűek	Baktériumos és gombabetegségek (kivéve lisztharmat)	1,75–2,0	800–1200
Konzerv uborka	Peronoszpóra, baktériumos betegségek	1,75–2,0	400–1500
Hüvelyesek (bab, borsó, szója, illencse, csicseriborsó, lóbab)	Baktériumos betegségek, fenésedés, peronoszpóra, rozsdabetegségek, aszkohitás foltosság	1,75–2,0	400–600
Burgonya	Burgonyavész, alternária	1,75–2,0	400–600
Paprika, paradicsom	Baktériumos és gomba- betegségek (kivéve lisztharmat)	2,0–3,0	400–1000
Hagyma	Peronoszpóra, baktériumos betegségek	1,75–2,0	400–600
Cukorrépa	Cerkospóra, ramuláriás és fómás levélfoltosság	1,75–2,0	400–600
Dísznövények, díszfa	Baktériumos betegségek, peronoszpóra, rozsdabetegségek	1,75–2,0 0,3–0,5%	400–600
Kabakosok	Peronoszpóra, baktériumos betegségek	1,75–2,0	400–1500

Javasolt növényvédelmi technológia:


Burgonyában a permetezéseket előrejelzése alapozva, preventív jelleggel kell kezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 8–12 naponként meg kell ismételni.

Cukorrépában a levélbetegségek elleni első védekezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor meg kell kezdeni, majd a továbbiakban az időjárási körülmények, illetve a járványhelyzet alakulásától függően 7–10 naponként javasolt megismételni.

Hüvelyes növényekben a védekezéseket lehetőleg megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor meg kell kezdeni. Viaszos felületű kultúrákban a permetlé jobb tapadása érdekében nedvesítő szer hozzáadása célszerű. A további védekezések szükségességéről a járványhelyzet alakulásától függően kell dönten.

A készítményt *almatermésű* kultúrákban baktériumos, gombás eredetű betegségek ellen (varasodás, monília, ágelhalás, stb.) a tavaszi és őszi időszakban, lemosó permetezés formájában javasolt kijuttatni. Tüzelhalás ellen a védekezéseket megelőző jelleggel, rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig 2–3 alkalommal lehet elvégezni, legalább 7–10 napos gyakorisággal, nagy lémenyiséggel. A termés viaszosodását követően zárópermetezésre a készítmény újból használható, a rézérzékenység, illetve a perzselési veszély figyelembe vételével. Faiskolai alany-, csemete- és oltványkertben tüzelhalás ellen a védekezéseket a fertőzést megelőző időszakban 14 naponként 300–400 l/ha vízzel 2–3 alkalommal kell elvégezni.





Őszibarackban tafrinás betegség ellen a lemosó permetezéseket legkésőbb rügyfakadáskor be kell fejezni, a perzselési veszély elkerülése érdekében. A baktériumos, gombás eredetű ágelhalás ellen a kezeléseket ősszel, a lombhullás kezdetén javasolt elvégezni.

Szilvában, meggyben, cseresznyében levéllyukacsosodás, monília betegség ellen a permetezéseket a vegetációs időszakban folyamatosan, a fertőzés alakulása szerint lehet elvégezni.

Kajsziiban a kezeléseket pirosbimbós állapot után már nem szabad folytatni.

Málnában a letermett vesszők lemetszése után, illetve a tavaszi metszéseket követően célszerű a permetezéseket elvégezni.

Héjas gyümölcsűekben a tavaszi fakadási időszakban, illetve a betegségek kezdeti tüneteinek megjelenését követően kell elkezdni a kezeléseket, és a fertőzéstől függően 10–14 naponként megismételni.

Szőlőben a kezeléseket a peronoszpóra ellen az előrejelzésre alapozva, preventíven javasolt elkezdni, amikor a hajtások hossza 20–25 cm, majd a fertőzés alakulása szerint 7–14 naponként célszerű megismételni.

Zöldségfélékben: paprikában, paradicsomban, kabakosokban, hagymában baktériumos és gombás betegségek ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva, preventíven szükséges elkezdni, majd a fertőzés alakulása szerint 2–3 alkalommal 10–14 naponként célszerű megismételni. Hagyma permetezésénél a permetléhez tapadásfokozó nedvesítő-szer hozzáadása indokolt.

Dísznövényekben és díszfákon előzetes rézérzékenység megállapítása után a baktériumos és gombás betegségek ellen a kezeléseket a kezdeti tünetek megjelenése után célszerű elkezdni.

A kezeléseket az előrejelzésekre alapozva, a betegség tüneteinek megjelenése előtt kell megkezdeni és a fertőzéstől függően megismételni. A permetlé mennyiségét a lombzat nagyságától, a kultúra művelési módjától, a kijuttató gép típusától függően kell megválasztani. A magasabb dózisokat csak igen erős fertőzési körülmények között kell alkalmazni. A fajták rézérzékenységét a kezelések időpontjában figyelembe kell venni.



Élelmezés egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

Kultúra	Várakozási idő (nap)	Megengedett maradék (mg/kg fémrész)
Gyümölcs, szőlő, zöldségfélék, cukorrépa	21	10
Alma	10	10
Kabakosok, hüvelyesek, málna	5	10
Uborka (konzerv)	3	10
Paprika, paradicsom, burgonya	7	10

