

## DUPLOSAN DP

**Folyékony  
gyomirtó  
permetezőszer.**

**Hatóanyag:  
600 g/l diklórprop-P.**

**Forgalmazási  
kategória: I.**

**Csomagolás:  
10 l-es műanyag  
kanna.**

**Felhasználható:**

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége (l/ha)	szükséges víz 300–400 Légi kijuttatás: 40–60
Kalászosok (őszi és tavaszi)	Kétszikű gyomok	1,5–2,0	

**Javasolt vízmennyiség:** földi kijuttatásnál 300–400 l/ha, légi kijuttatásnál 40–60 l/ha vízmennyiség felhasználásával.

**Javasolt növényvédelmi technológia:**

A szer felhasználható őszi és tavaszi kalászosokban 3–4 leveles kortól a bokrosodás végéig 1,5–2,0 l/ha mennyiségben. A készítmény jól irtja a ragadós galajt (*Galium aparine*), a tyúkhúrt (*Stellaria media*), a keserűfű fajokat (*Polygonum* spp.), a vadrepcét (*Sinapis arvensis*), a zsombor fajokat (*Descurainia* spp), a repcsényretket (*Raphanus raphanistrum*), a vadsósokát (*Rumex* spp.), a mezei acatot (*Cirsium arvense*), a mezei tarsókát (*Thlaspi arvense*), a tyúkhúrt (*Stellaria media*), szarkaláb féléket (*Consolida* spp.). Közepesen hatékony a kék búzavirág (*Centaurea cyanus*), a füstike fajok (*Fumaria* spp), a kamilla fajok (*Matricaria* spp.), a veronika fajok (*Veronica* spp.) és a boglárka fajok (*Ranunculus* spp.) ellen.



Hatástalan az árvacsalán (*Lamium* spp.) fajok és a kenderkefű fajok (*Galeopsis* spp.) ellen.

A permetezést a magról kelő gyomok 2–4 leveles, illetve a ragadós galaj 1–3 levélörvös fejlettségi állapotában kell elvégezni.

**Hatáskifejtés:** felszívódó hormon hatású készítmény.

**Kijuttatási idő:** a kezelés után 3 órával lehullott csapadék már nem csökkenti a készítmény tökéletes felszívódását a gyomnövényekbe.

A Duplosan DP szelektivitása részben morfológiai, ezért a kultúrnövény levelének egészséges viaszbevonata és a durva cseppképzés a szelektivitását nagymértékben javítja. Csapadékos időben nem javasolt a kezelés, nagyobb eső után 1–2 napot érdemes várni a kijuttatással.

