

DUPLOSAN KV

Folyékony gyomirtó permetezőszer.

Hatóanyag:
600 g/l mecoprop-p.

Forgalmazási
kategória: I.

Csomagolás:
10 l-es műanyag
kanna.



Felhasználható:

Kultúra	Károsító	szer	A kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha)
Kalászosok (őszi és tavaszi)	Kétszikű gyomnövények	1,5	300-400 Légi kijuttatás: 40-60

Javasolt növényvédelmi technológia:

A szer felhasználható őszi és tavaszi vetésű kalászosokban 3–4 leveles kortól a bokrosodás végéig 1,5 l/ha mennyiségben. A készítmény jól irtja a ragadós galaj (*Galium aparine*), a tyúkhúr, (*Stellaria media*), a pásztortáska, (*Capsella bursa-pastoris*), a libatop félék, (*Chenopodium* spp.), a keserűfű félék, (*Polygonum* spp.), a vadrepce, (*Sinapis arvensis*), a vadsóska, (*Rumex* spp.), a repcsényreték, (*Raphanus raphanistrum*), a mezei tarsóka, (*Thlaspi arvense*), a veronika félék, (*Veronica* spp.), a bükköny félék, (*Viciai* spp.) gyomnövényeket. Közepesen hatékony a mezei acat, (*Cirsium arvense*), a kék búzavirág, (*Centaurea cyanus*), a füstike félék, (*Fumaria* spp.), a boglárka félék, (*Ranunculus* spp.), a székfű félék, (*Matricaria* spp.) gyomok ellen. Hatástalan az árvacsalán, (*Lamium* spp.), a kenderkefű félék, (*Galeopsis* spp.) gyomnövényekre. A permetezést a magról kelő kétszikű gyomok 2–4 leveles, illetve a *Galium aparine* 1–3 levélörvös fejlettségi állapotában kell elvégezni. A készítmény hatáskiegészítés céljából kalászos gabonában engedélyezett egy hatóanyagot tartalmazó szerrel kombinálható.

Légi kijuttatás: gabonafélékben 40–60 l/ha vízmennyiség felhasználásával.

Hatáskifejtés: felszívódó hormon hatású készítmény.

Kijuttatási idő: a kezelés után 3 órával lehullott csapadék már nem csökkenti a készítmény tökéletes felszívódását a gyomnövényekbe. A Duplosan KV szelektivitása részben morfológiai, ezért a kultúrnövény levelének egészséges viaszbevonata és a durva cseppképzés a szelektivitását nagymértékben javítja. Csapadékos időben nem javasolt a kezelés, nagyobb eső után 1–2 napot érdemes várni a kijuttatással.

