

MECOMORN 750 SL

Folyékony
gyomirtó
permetezőszer.

Hatóanyag:
750 g/l MCPA.

Forgalmazási
kategória: I.

Felhasználható:

Kultúra	Károsító	Dózis l/ha	Permetlé l/ha
Őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, triticale, köles, rizs		0,8–1,0	100–400
Rét- legelő	Kétszikű gyomok	1,2–1,4	300–400
Rost- és olajlen		0,4–0,5	300
Szőlő, gyümölcs		0,8–1,0	300–400
Római kamilla		0,6–0,8	300–400

Csomagolás:
5 l-es műanyag
kanna.

Javasolt növényvédelmi technológia:

Kalászosokban felhasználható a kalászosok 3 leveles fejlettségi állapota után a szárbaindulás kezdetéig, a kétszikű gyomok 2–4 leveles állapotában. A kezelés után 3 órával lehullott csapadék már nem befolyásolja a készítmény felszívódását a gyomnövényekbe. Csapadékos időben nem javasolt a kezelés, nagyobb eső után 1–2 napot várni kell a kijuttatással. A gyomirtás elvégzése 10 és 25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. Rét, legelő gyomirtása esetén a kezelést tavasszal, a gyomok intenzív növekedési szakaszában – 5–10 cm-es növénymagasság mellett – kell végrehajtani. Javasolt a Mecomorn-t 1 l/ha tapadásfokozóval kombinálni. A kezelés után 15 napig legeltetni tilos! Rost- és olajlen gyomirtására a szert a kultúrnövény 8–12 cm-es fejlettségénél kell kijuttatni, durva cseppek (250–300 mikron) formájában. Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2–3 csapadékmentes nap után végezzük. *Rizsben* a kezelést a növény 3 leveles állapotától 15–20 cm-es fejlettségig lehet elvégezni. Négy évesnél idősebb telepítésű *szőlő ültetvényben* a kezelést a szőlő bogyók borsó nagyságú fejlettsége után 0,8–1,0 l/ha dózisban, 300–400 l/ha vízzel kell végrehajtani, durva cseppek (300–400 mikron) alkalmazásával. A permetezést úgy kell

végezni, hogy a permetlé a növény zöld részére ne jusson, mert károsodást idézhet elő. Az eljárás csak sorkezeléssel alkalmazható. Négy évesnél idősebb telepítésű *gyümölcsösben* a virágzás előtt, vagy a mogyoró nagyságú alma megjelenése után 0,8–1,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni, a szőlőnél leírt módon. Római kamilla 5–10 cm magas állományban 0,6–0,8 l/ha dózisban, 300–400 l/ha vízzel kell a szert kipermetezni. A készítmény nem hatásos a poloskafű, (*Bifora radians*), mádárhúr, (*Cerastium spp.*), füstike, (*Fumaria spp.*), ragadós galaj, (*Galium aparine*), gólyaorr, (*Geranium spp.*), árvacsalán, (*Lamium spp.*), székfű, (*Matricaria spp.*) tyúkhúr, (*Stellaria media*), pipitér, (*Anthemis spp.*) keserűfű féle gyomnövények ellen.

A Mecomorn szelektivitásának alapja a durva cseppképzés. A túl finom ködszerű cseppképzés növeli az elsodródás veszélyét és csökkenti a szelektivitást. Kerüljük a permetlé elsodródását a szomszédos kultúrákra, ezért nyugodt szélmentes időben permetezzünk.

Légi kijuttatás: kalászosokban, valamint rost- és olajlen kultúrákban 40–60 l/ha vízzel.

Hatáskifejtés: felszívódó hormon hatású készítmény.

Kijuttatási idő: a kezelés után 3 órával lehullott csapadék már nem csökkenti a készítmény tökéletes felszívódását a gyomnövényekbe. A Mecomorn 750 SL szelektivitása részben morfológiai, ezért a kultúrnövény levelének egészséges viaszbevonata és a durva cseppképzés a szelektivitását nagymértékben javítja. Csapadékos időben nem javasolt a kezelés, nagyobb eső után 1–2 napot érdemes várni a kijuttatással.

