

MEXTROL B

**Folyékony
gyomirtó
permetezőszer
(EC).**

Hatóanyag:
235 g/l bromoxinil.

**Forgalmazási
kategória:** II.

Csomagolás:
5 l-es műanyag
kanna.

Felhasználható:

Kultúra	Károsító	Dózis l/ha	É.v.i. (nap)	Kultúra fejlődési stádiuma
Kukorica, őszi búza	Magól kelő kétszikű gyomok, árvalakésű napraforgó	1,0–1,5	60	Őszi búzában a kultúrnövény 2 leveles korától a szárbaundulás kezdetéig használható. Kukoricában a kultúrnövény 10–20 cm-es koráig használható.

Javasolt növényvédelmi technológia:

Őszi búzában a kultúrnövény 2 leveles korától a szárbaundulás kezdetéig használható. A kezelés legalkalmasabb időpontja a kétszikű gyomnövények 2–4 leveles állapota. Kukoricában a kultúrnövény 10–20 cm-es koráig használható. A gyomok 2–4 leveles állapotukban a legérzékenyebbek. A szer kifejezetten hatékony az árvalakésű napraforgó és az atrazin rezisztens fajok (pl. disznóparéj, (*Amaranthus* spp.), libatop, (*Chenopodium* spp.), parlagfű, (*Ambrosia artemisiifolia*), selyemmályva, (*Abutilon theophrasti*), csattanó maszlag, (*Datura stramonium*), vadrepce, (*Sinapis arvensis*) stb. ellen. Tartós hatása nincs (kontakt), csak a kezelés idején meglévő kétszikű gyomokat pusztítja. 25 °C felett a perzselés veszélye miatt ne permetezzünk.



Kombinálhatóság: minden kombináció esetén a permetezőgépbe történő betöltés előtt keverési próbát kell végezni!

Őszi búzában élő növényekkel fertőzött területen Mecomorn 750 SL engedélyezett dózisaival kombinálható.

Kukoricában egyszikűekkel fertőzött területen Titus 25 DF engedélyezett dózisaival kombinálható.

Hatás/hatásspektrum: magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony.

Hatáskifejtés: kontakt, perzselő hatású készítmény.

Kijuttatási idő: a gyomok 2–4 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre.

A kultúrnövény levelének egészséges viaszbevonata és a durva cseppképzés a szelektivitását nagymértékben javítja. Csapadékos időben nem javasolt a kezelés, nagyobb eső után 1–2 napot érdemes várni a kijuttatással.

Permetlé vízmennyisége: 200–300 l/ha.

Permetléporlasztás: durva porlasztás.

Ideális hőmérséklet: 5 °C felett.

Ideális időszak: a permetcsepp beszáradását követően lehullott csapadék nem befolyásolja a gyomirtó hatást.

Hatásnövelő körülmények: napfényes időjárás.

Felhasználás gyakorisága: évente egyszer.

Utóvetemény-korlátozás: normál vetésváltásnál nincs.

