

MEZZO

Gyomirtó permetezőszer granulátum (WG).

Hatóanyag:
20% metszulfuron-
metil.

Forgalmazási
kategória: I.

Csomagolás:
100 g-os műanyag
doboz
mérőkupakkal.



Felhasználható:

| Kultúra | Károsító | A kijuttatáshoz szükséges | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | | szer (g/ha) | víz (l/ha) |
| Őszi árpa, búza | Magról kelő kétszikű gyomok | 20–30 | 200–300 |

Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3 leveles állapotától a bokrosodás végéig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles korukban, a ragadós galaj (*Galium aparine*) 1–3 levél-örvös fejlettségekor a legérzékenyebb a készítményre. A gyomirtó hatás fokozására permetléhez hatásfokozó adalékanyagot kell keverni. A nem cél növények védelme érdekében elsodródás csökkentő szórófej használata javasolt.

Kombinálhatóság: minden kombináció esetén a permetezőgépbe történő betöltés előtt keverési próbát kell végezni!

Ősszel erős egyszikű gyomfertőzés esetén Lentipur® 500 SC-vel való kombinálása javasolt. Tavasszal egynyári és évelő kétszikű gyomok (pl. acat) erős fertőzése esetén Mecomorn, Dulosan DP, Duplosan KV, Solar termékekkel kombinálható.

Ragadós galajjal fertőzött területen Tandus 0,33 l/ha-os dózisával együtt juttassuk ki.

Hatás/hatásspektrum: magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony. A mezei acat 15–25 cm-es hajtásai érzékenyek a gyomirtó szerrel szemben, a permetezés után 2–3 héttel elpusztulnak. Később megjelenő hajtások kismértékű depressziót mutatnak.

Hatáskifejtés: fehérjeszintézis-gátló hatású.

Kijuttatási idő: a gabona bokrosodásának idején a gyomnövények tölevélrózsás, illetve 2–8 leveles fejlettségi állapotánál.

Permetlé vízmennyisége: 200–300 l/ha.

Permetléporlasztás: finom porlasztás.

Ideális hőmérséklet: 5 °C felett.

Ideális időszak: a permetcsepp beszáradását követően lehullott csapadék nem befolyásolja a gyomirtó hatást.

Hatásnövelő körülmények: napfényes időjárás.

Felhasználás gyakorisága: évente egyszer.

A kalászos gabonát egy tenyészidőszak alatt csak egyszer kezelje szulfonil-urea típusú készítménnyel!

Utóvetemény-korlátozás: a felhasználás évében repce vetése nem javasolt.

