

## MYSTIC

Folyékony  
gombaölő  
permetezőszer  
(EC)

Hatóanyag:  
250 g/l  
tebukonazol.

Forgalmazási  
kategória: III.

Csomagolás:  
1 l-es  
műanyag flakon,  
5 l-es  
műanyag kanna.

### Felhasználható:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer víz mennyiség (l/ha)	
Csonthéjasok (őszibarack, kajszibarack, mandula, meggy, cseresznye, szilva)	Monília virág- és hajtáselhalás, tafrinás betegség, blumeriellás levélfoltosság	0,75–1,0	800–1200
Szőlő	Lisztharmat	0,4	700–1000
Gabonafélék (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále)	Lsztharmat, rozstda, szeptória, Drechslera, kalászfuzáriózis	0,75–1,0	200–400
Őszi káposztarepce	Alternáriás-, fómás- és fehérpenészes levél-, hajtás és becőfertőzés, növekedésgátlás	0,75–1,0	300–400

### Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítményt *gabonafélékben* bokrosodás végén – 3 nóduszos fejlettségnél és kalászhányáskor – virágzáskor; *őszi káposztarepceben* ősszel 4–6 leveles állapotban, tavasszal az oldalhajtások képződése, illetve virágzás idején; *csonthéjasokban* virágzás kezdetén (kb. 30% virágnylás), fővirágzásban (kb. 90% virágnylás), majd – hűvös, csapadékos időjárás esetén – szirmhulláskor kell kijuttatni.



*Cseresznyében és meggyben* blumeriellás levélfoltosság ellen virágzás végétől 10–14 napos időközönként kell a védekezéseket elvégezni. Erős fertőzésveszély esetén a kezeléseket természüret után is folytatni kell.

*Őszibarackban* tafrinás levélfodrosodás ellen a rezes lemosó permetezéseket követően – hűvös, csapadékos tavaszi időjárásnál – a védekezéseket 7–10 naponként kell folytatni az idő felmelegedéséig (kb. május közepéig).

*Szőlőben* lisztharmat ellen a fertőzésveszélyes fenológiai stádiumban (virágzástól fürtzáródásig) kell a védekezést végezni 10–14 napos permetezési fordulókkal. Erős fertőzésveszély esetén a készítményt kontakthatású készítménnyel kell kombinálni.

#### Élelmezés egészségügyi várakozási idők:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
Gabonafélék	30
Repce	35
Csonthéjasok	14
Szőlő	35

