

SOLUTION

Gyomirtó permetezőszer

Hatóanyag:
96,9% 2,4-D.

Forgalmazási
kategória: I.

Csomagolás:
5 kg-os papírszák.

Felhasználható:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges	
		szer (kg/ha) mennyisége	víz (l/ha)
Őszi és tavaszi kalászosok (kivéve sörárpa)	Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények	0,7	250–300
Kukorica (takarmány)	Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények	0,7	250–300
Rét, legelő	Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények	1,0	250–300

Javasolt növényvédelmi technológia:

Őszi és tavaszi kalászosokban (sörárpa kivételével) a készítményt a kultúrnövény 3–4 leveles fejlettségétől a bokrosodás végéig lehet kijuttatni. *Kukoricában* a készítményt a kultúrnövény 3–5 leveles korában, 10–20 cm-es fejlettsége idején kell kipermetezni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 leveles korokban, az acat (*Cirsium arvense*) tölevélrózsás állapotában, az aprószulák (*Convolvulus arvensis*), sövényiszulák (*Calystegia sepium*) 15–20 cm-es nagyságánál a legérzékenyebb a készítményre.

A szer hatás-kiegészítés céljából kalászosokban, kukoricában engedélyezett, egy hatóanyagot tartalmazó herbicidekkel kombinálható, az engedélyokiratukban meghatározott dózisukban.



Rét, legelőn a kezelést a magról kelő kétszikű gyomnövények 2–6 leveles fejlettségekor kell elvégezni. A nehezen irtható évelő kétszikűek (*Eryngium campestre*, *Ononis spinosa*) esetében, azok intenzív növekedési stádiumában kell a készítményt kijuttatni.

Nedvesítőszer hozzáadásával a gyomirtó hatás fokozható.

Éjszakai fagyok esetén tilos a készítménnyel kezelni.

A munka folyamán különös gondot kell fordítani arra, hogy a permetlé elsodródásából adódóan a szerte érzékeny kultúrákat károsodás ne érje.

Kijuttatási idő: a kezelés után 3 órával lehullott csapadék már nem csökkenti a készítmény tökéletes felszívódását a gyomnövényekbe.

A Solution szelektivitása részben morfológiai, ezért a kultúrnövény levelének egészséges viaszbevonata és a durva cseppképzés a szelektivitását nagymértékben javítja. Csapadékos időben nem javasolt a kezelés, nagyobb eső után 1–2 napot érdemes várni a kijuttatással.

