

DEZORMON

Folyékony gyomirtó permetezőszer.

Hatóanyag:
600 g/l 2,4-D
dimetilamin-só
formában.

Forgalmazási
kategória: I.

Csomagolás:
1 l-es műanyag
palack,
5 l-es műanyag
kanna.



Felhasználható:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges víz	
		szer	menyisége (l/ha)
Gabonafélék	Kétszikű gyomok	1,2	200–400 Légi kijuttatás: 40–60
Kukorica	Kétszikű gyomok	1,0	200–400 Légi kijuttatás: 40–60

Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítmény *gabonafélékben* (sörárpa kivételével) posztemergensen a növény 3–4 leveles fejlettségétől a szárbaindulásig, a gyomok 2–4 leveles állapotában használható fel, 1,2 l/ha dózisban, 40–400 l/ha permetlében.

Kukoricában a kezelést a kukorica 3–5 leveles, illetve 10–20 cm-es fejlettségénél lehet végrehajtani.

A szer jól irtja az *Amaranthus* spp. (disznóparéj fajok), *Chenopodium* spp. (libatop fajok), *Cirsium arvense* (mezei acat), *Convolvulus arvensis* (apró szulák), *Conyza canadensis* (betyárkóró), *Galinsoga parviflora* (kicsiny gombvirág), *Hibiscus trionum* (varjúmák), *Lamium purpureum* (piros árvacsalán), *Lathyrus* spp. (lednek fajok), *Papaver rhoeas* (pipacs), *Plantago major* (nagy útifű), *Portulaca* spp. (porcsin fajok), *Raphanus raphanistrum* (repcényretek), *Sinapis arvensis* (vadrepce), *Solanum nigrum* (fekete csucsor), *Vicia* spp. (bükköny fajok) gyomnövényeket. A kezelést 12–15 °C-on célszerű elvégezni.

A szer hatás-kiegészítés céljából a gabonában engedélyezett egy hatóanyagot tartalmazó készítménnyel kombinálható.

Kombinálhatóság: minden kombináció esetén a permetezőgépbe történő betöltés előtt keverési próbát kell végezni!

Hatás/hatásspektrum: egynyári és évelő kétszikű gyomnövények.

Hatáskifejtés: felszívódó hormon hatású készítmény.

Kijuttatási idő: a kezelés után 3 órával lehullott csapadék már nem csökkenti a készítmény tökéletes felszívódását a gyomnövényekbe. A Dezormon szelektivitása részben morfológiai, ezért a kultúrnövény levelének egészséges viaszbevonata és a durva cseppképzés a szelektivitását nagymértékben javítja. Csapadékos időben nem javasolt a kezelés, nagyobb eső után 1–2 napot érdemes várni a kijuttatással.

Permetlé vízmennyisége: 200–300 l/ha.

Permetléporlasztás: durva porlasztás.

Ideális hőmérséklet: 12–15 °C felett.

Ideális időszak: a gyomnövények kelése után, azok kezdeti fejlettségénél (2–3 leveles állapot). A permetcsepp beszáradását követően lehullott csapadék nem befolyásolja a gyomirtó hatást.

Hatásnövelő körülmények: napfényes időjárás.

Felhasználás gyakorisága: évente egyszer.

Utóvetemény-korlátozás: normál vetésváltásnál nincs.

