

DICOPUR TOP 464 SL

erbicid

Contine : 344 g/l acid 2,4 D din SDMA + 120 g/l dicamba
Omologat in Romania cu Certificat de omologare nr.
2679/19.12.2006



Mod de actiune:

Erbicidele phenoxy sunt foarte selective pentru culturile de grau si porumb. Aplicare pe buruieni, acestea adera la suprafata frunzei si patrund in planta. O parte din substanta activa este transportata catre varfurile de dezvoltare iar alta spre radacina. Datorita excesului de auxine ce apare in interiorul buruienii, metabolismul acesteia devine extrem de ridicat, celulele se alungesc iar cresterea devine necontrolabila. In final, ca urmare a consumului ridicat de resurse metabolice, buruienile se usuca.

Un grad maxim de eficienta se atinge pe vreme umeda si calda de durata, deoarece pe vreme propice de crestere si dezvoltare buruienile sunt foarte sensibile la tratamentul chimic.

Proprietati fizico-chimice:

Dicopur Top 464 SL se prezinta sub forma de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben brun, ce contine 344 g/l acid 2,4 D din sare DMA si 120 g/l dicamba.

Dicopur Top 464 SL este o combinatie de 2 substante active, acid 2,4 D si dicamba, este un erbicid selectiv si sistemic, actionand asupra buruienilor prin absorbtie atat la nivelul frunzelor cat si a sistemului radicular.

Recomandari de utilizare:

Dicopur Top 464 SL este omologat in Romania conform tabelului de mai jos:

Cultura

Grau

Buruieni combatute

Buruieni dicotiledonate anuale si perene

Doza de aplicare l/ha

0,8 - 1 l/ha, in functie de gradul de infestare si talia buruienilor - postemergent (grau la faza de infratire - formarea primului internod, buruieni dicotiledonate la 2-4 frunze)

Porumb

Buruieni dicotiledonate anuale si perene

1 l/ha postemergent (porumb in faza de 4-6 frunze, buruieni dicotiledonate la 2-4 frunze, Cirsium < 10 cm inaltime)



Mod de intrebuintare:

Dicopur Top 464 SL se aplica in postemergența la culturile de grau și porumb in vederea combaterii a numeroase specii de buruieni dicotiledonate anuale și perene.

- La culturile de cereale paioase se aplica de la faza de infratire a cerealelor pana la formarea primului internod iar speciile de buruieni sa fie in faza mica, de cca 2-4 frunze și maxim 10-15 cm inaltime pentru buruienile perene.

Nu este recomandata aplicarea erbicidului cand cerealele paioase sunt in faza avansata (peste 3 internodii) deoarece apar efecte fitotoxice cu reducerea productiei la hectar.

- La cultura de porumb Dicopur Top 464 SL se aplica atunci cand plantele de cultura au 4-6 frunze iar buruienile sunt in faza de rozeta.

Printre buruienile combatute se numara:

Amaranthus retroflexus (stir)
Abuthilon theoprasti (teisor)
Anthemis arvensis (romanita)
Brassica nigra (mustar negru)
Chenopodium album (loboda salbatica)
Capsella bursa pastoris (traista ciobanului)
Cirsium arvense (palamida)
Convolvulus arvensis (volbura)
Delphinium consolida (nemtisor de camp)
Fumaria officinallis (fumarita)
Matricaria chamomilla (musetel mirositor)
Polygomun aviculare (troscot)
Polygonum convolvulus (hrisca)
Rubus caesius (mur)
Stelaria media (rocoina)
Sisymbrium officinale (voinicica)
Sonchus arvensis (susai), etc.

Cantitatea de solutie recomandata a se aplica pe suprafata de un ha este de 200-400 litri.

Compatibilitate:

Produsul Dicopur Top 464 SL este compatibil cu unele produse folosite in agricultura, mai putin cele cu reactie bazica. Inainte de utilizare verificati listele de compatibilitate și efectuati un test.

Distribuitor:

Nufarm Romania SRL, Str.Popa Savu, Nr. 77
Et. 1, Ap. 2, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021/ 224.63.20; 0724NUFARM

Producator:

Nufarm GmbH & Co KG
Linz, A4021, St. Peter Strase 25

NUFARM ROMÂNIA SRL - membru Nufarm Ltd. Australia

Str Popa Savu 77, Et.1, Ap.2, sect.1 București, Tel: 021/2246320/Fax: 021/2246319
0724 N U F A R M www.nufarm.ro