ALLEGORY®

Glyphosate 18% + MCPA 18% **Πυκνό διάλυμα (SL)**

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία 1: Glyphosate οξύ 18% β/ο
(Σε μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 24,29% β/ο)
Δραστική ουσία 2: MCPA οξύ 18% β/ο
(Σε μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 23,30% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 66,5% β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες καθώς και για την αντιμετώπιση των λαίμαργων στην ελιά.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70153/11-04-2016

Κάτοχος της άδειας / Υπεύθυνος επικοινωνίας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210-6990932, fax: 2106990862
e-mail: info@gr.nufarm.com

Περιεχόμενο:

23528/0416/GR

1 λίτρο ℮

Nufarm

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το **ALLEGORY**® είναι συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, όπου ανατρέπει την ανάπτυξη των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ φρουτ, Κιτριά, Φράπα), ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά): Για την αντιμετώπιση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-αρχές Καλοκαιριού) με δόση: 300-600 κ.εκ. σκευάσ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 25-40 λίτρα/στρ.

Ελιά: Για την αντιμετώπιση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων, εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό την άνοιξη ή το φθινόπωρο με δόση 300-600 κ.εκ. σκευάσ./στρ. και όγκο ψεκαστικού υγρού 25-40 λίτρα/στρ. Για την αντιμετώπιση των λαίμαργων, εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό των λαίμαργων την άνοιξη με ομοιόμορφη κάλυψη όταν το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 25 εκ. με δόση 300-600 κ.εκ.σκευάσ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 35 λίτρα/στρ.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Για την αντιμετώπιση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης με δόση 300-390 κ.εκ. σκευασ./στρ. και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/ στρ.

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Γεράνι *(Geranium dissectum)*, Αλεπονουρά *(Alopecurus Mysuroides)*, Τραχύς ζωχός *(Sonchus asper)*, Καψέλλα *(Capsella bursa-pastoris)*, Κίρσιο *(Cirsium arvensis)*
Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριοβρώμη *(Avena fatua)*, Ήρα *(Lollium multiflorum)*
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Μαρτιάκος *(Senecio vulgaris)*, Ήμερο σινάπι *(Sinapis alba)*, Ζωχός *(Soncus sp.)*, Οξαλίδα *(Oxalis per carpae)*, Λάπαθο *(Rumex crispus)*, Κοινή βελονίδα *(Erodium cicutarium)*

Παρατηρήσεις:
1. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3ο-4ο έτος φύτευσής τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Στην καλλιέργεια της Ελιάς να μην εφαρμόζεται εφόσον παρατηρηθεί καρπόπτωση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερού στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φόρες με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Να μην αναμιγνύεται με άλλα σκευάσματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή η ταχύτητα του ανέμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5m/sec. • Το ποσοστό σταγόνας μεγέθους κατω των 100μm δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2%. • Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C. • Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. • Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες (σταυρανθή,ψυχανθη, κολοκυνθοειδη, ηλίανθο, μαρούλι, τεύτλα, τομάτα, αμπέλι, στραμωνιο, καπνά, καλλωπιστικά και καρποφόρους θάμνους), γι΄αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές, ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος και μην το εφαρμόζετε όταν οι ευπαθείς καλλιέργειες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων. • Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στις δραστικές ουσίες glyphosate και MCPA.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: • Μην εισέρχεστε στην περιοχή που έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα. •Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακρια από την ψεκασμένη περιοχή για δύο (2) εβδομάδες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
" Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά το ψεκασμό".
" Οι χειριστές κατά την ανάμιξη/φόρτωση/εφαρμογή να φορούν προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία και καταλλήλες μπότες. Κατά την εφαρμογή με γεωργικό ελκυστήρα με κλειστή καμπίνα, τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον τα παράθυρα παραμένουν κλειστά".

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από στύχημα: Γενικά: Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του. Κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιλυγισμένα. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρο. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον ασθενή από τον χωρο της έκθεσης σε καθαρο αέρα. Ελέγχετε την αναπνοή και εφοσον είναι απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητη αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τις μολυσμένες περιοχές με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρο εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτα δια στόματος. Μεταφέρετε τον παθόντα στο νοσοκομείο, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. **Πληροφορίες για τον ιατρο:** Συνιστάται ελεγχος της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για τις ακαλλιέργητες εκτάσεις και **10 μέτρων** για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες, από μη γεωργική γη.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την ελιά και **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τα καρποφόρα (εσπεριδοειδη, μηλοειδη, πυρηνόκαρπα και ακρόδρυα).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό αν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Για όλες τις καλλιέργειες: 15 ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χωρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία έως 40°C.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας: