

FICHA TÉCNICA
SURFLAN® A.S.
HERBICIDA

Marzo 2012

INFORMACION GENERAL			
Ingrediente Activo:	Oryzalin		
Nombre Químico:	3-5-dinitro-N4-N4-dipropilsulfonilamida (equivalente a 40.4% p/p)		
Grupo Químico:	Dinitroanilinas		
Concentración:	48% p/v		
Formulación:	Concentrado soluble (SL)		
Modo de Acción:	Es un herbicida residual suelo-activo, de baja volatilidad que inhibe la germinación de semillas de malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha.		
Fabricante:	United Phosphorus Ltd., India		
Importador y Distribuidor:	Nufarm Chile Ltda. Av. Las Condes 11.380, Oficina 72 Vitacura, Santiago de Chile		
Toxicidad:	IV (Verde). Producto que normalmente no ofrece peligro		
Antídoto:	No tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático y de sostén.		
Autorización SAG N°:	3229		
INFORMACION GENERAL			
<p>Surflan A.S. es un herbicida residual suelo-activo, de baja volatilidad que inhibe la germinación de semillas de malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha.</p> <p>Surflan A.S. por su modo de acción debe emplearse en preemergencia de malezas con suelo mullido y libre de vegetación al momento de la aplicación. N controla malezas emergidas.</p>			
INSTRUCCIONES DE USO:			
Plantaciones frutales	Dosis de uso	Malezas controladas	Observaciones
Almendro Cerezo Ciruelo Damasco Durazno Nectarin Frambuesa Arándano Frutilla Mora Kiwi Manzanos Perales Paltos Vides Limonero Naranja Clementina Pomelo Tangerina Tangelos Mandarina	4 a 8 L/ha Usar la dosis mínimas al mezclar con otros herbicidas suelo activos	Gramíneas Hualcacho (<i>Echinochloa spp.</i>) Maicillo (semilla) (<i>Sorghum halepense</i>) Setarias (<i>Setaria spp.</i>) Piojillo (<i>Poa spp.</i>) Bromos (<i>Bromus spp.</i>) pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Avenilla (<i>Avena fatua</i>) Pasto de la perdiz (<i>Panicum capillare</i>) Ballicas (<i>Lolium spp.</i>) Hoja Ancha Quilloi-quilloi (<i>Stellaria media</i>) Quinguilla (<i>Chenopodium spp.</i>) Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>) Bledo (<i>Amarantus retroflexus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bolsita del pastor (<i>Capsella Bursa pastoris</i>)	Surflan® A.S. no controla malezas emergidas. Aplicar sobre suelo mullido libre de vegetación. Puede mantener su actividad hasta por tres semanas sobre la superficie del suelo en ausencia de lluvias. Puede aplicarse desde el primer año de la plantación en frutales y forestales. Para malezas emergidas emplear herbicidas post emergentes.
Plantaciones forestales:			
Eucaliptos Pino radiata			

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Agite el envase antes de usar. Llene el estanque de la pulverizadora hasta la mitad, haga una pre mezcla con la cantidad necesaria de Surflan A.S. y agitando, complete el volumen de agua. Aplicar con un volumen de agua de 400 L/ha tratada.
INCOMPATIBILIDAD
Ninguna conocida
FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico para los cultivos recomendados. No sembrar cultivos susceptibles durante 6 meses a un año después de la aplicación.
TIEMPO DE REINGRESO (PERSONAS Y ANIMALES)
No ingresar hasta 12 horas de la aplicación.
PERIODO DE CARENCIA (DIAS)
No corresponde por ser herbicida suelo activo no translocable.

Advertencias: NUFARM CHILE LTDA., sólo es responsable de las características fisicoquímicas de este producto. Al no ejercer el control técnico de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven de este producto, distinto al indicado en esta Ficha Técnica. Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.